⑥ 実験などから相加・相乗効果が推定されている抗てんかん薬の組み合わせ

追加薬＼先行薬剤：表内は先行薬剤の変化（空欄は変化なし）	CBZ	CLB	CZP	ESM	PB	PHT	PRM	VPA	GBP	LEV	LTG	LCM	PER	PGB	RFN	STP	TPM	VGB	ZNS	AZM
CBZ	↓～↓↓（自己誘導）	多様・複雑	↓～↓↓	↓↓↓		多様・複雑	多様・複雑	↓↓↓		↓～↓↓	↓↓↓	↓～↓↓	↓↓↓		↓～↓↓	↓↓↓	↓↓↓		↓↓↓	
CLB	多様・複雑		不明			↑↑	↑～↑↑	↑～↑↑												
CZP		不明																		
ESM								↓～↓↓												
PB	↓↓↓	多様・複雑	↓～↓↓	↓↓↓		多様・複雑	不明	↓↓↓		↓～↓↓	↓↓↓	↓～↓↓	↓～↓↓		↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓		↓↓↓	
PHT	↓↓↓	多様・複雑	不明	↓↓↓	↑～↑↑		多様・複雑	↓↓↓		↓～↓↓	↓↓↓	↓～↓↓	↓↓↓		↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓		↓↓↓	
PRM	↓↓↓	多様・複雑	不明	↓↓↓	不明	多様・複雑		↓↓↓		↓～↓↓	↓↓↓	↓～↓↓	不明		↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓		↓↓↓	
VPA	多様・複雑	不明	不明	多様・複雑	↑↑↑	多様・複雑	↑↑↑				↑↑↑				↑～↑↑	不明	↓～↓↓		↓～↓↓	
GBP																				
LEV																				
LTG			↓～↓↓					↓～↓↓												
LCM		不明																		
PER					↓～↓↓（PB高濃度時）															
PGB									不明											
RFN	↓～↓↓	不明	不明		↑～↑↑	↑～↑↑	不明				↓～↓↓	不明				不明			不明	
STP	↑↑↑	↑↑↑	不明		↑～↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↑～↑↑			不明	不明	不明		不明				不明	
TPM		不明	不明			↑～↑↑							↓～↓↓		不明	不明			不明	
VGB						↓～↓↓									↓～↓↓					
ZNS		不明	不明		不明		不明					不明			不明	不明	不明			
AZM	↑↑					↑↑														