

7 抗てんかん薬が影響する薬剤

抗てんかん薬	影響を受ける薬剤	
	血中濃度が上昇、作用増強する薬剤	血中濃度が低下、作用減弱する薬剤
バルプロ酸	ワルファリン、三環系抗うつ薬、グアンファシン	
トピラマート	リチウム	三環系抗うつ薬、リスペリドン、経口血糖降下薬、ジギタリス、経口避妊薬
アセタゾラミド	ジギタリス	
カルバマゼピン	MAO 阻害薬	テオフィリン、副腎皮質ステロイド、シクロスポリン、タクロリムス、ワルファリン、カルシウム拮抗薬、ハロペリドール、リスペリドン、三環系抗うつ薬、SSRI、アリピプラゾール、ジギタリス、アセトアミノフェン、アゾール系抗真菌薬、経口避妊薬
フェノバルビタール、プリミドン	抗ヒスタミン薬、メチルフェニデート、フェノチアジン誘導体、MAO 阻害薬	テオフィリン、副腎皮質ステロイド、シクロスポリン、タクロリムス、ワルファリン、カルシウム拮抗薬、三環系抗うつ薬、SSRI、経口避妊薬
フェニトイン	ワルファリン	副腎皮質ステロイド、シクロスポリン、カルシウム拮抗薬、メキシレチン、三環系抗うつ薬、SSRI、甲状腺ホルモン、インスリン、経口血糖降下薬、アゾール系抗真菌薬、経口避妊薬
スチリベントール	テオフィリン、カフェイン、マクロライド系抗真菌薬、抗ヒスタミン薬、非ステロイド性抗炎症薬、タクロリムス、シクロスポリン、ワルファリン、アゾール系真菌薬、プロトンポンプ阻害薬、カルシウム拮抗薬、経口避妊薬、HIV プロテアーゼ阻害薬、スタチン系薬剤、β遮断薬、抗うつ薬、向精神薬、コデイン、デキストロメトルフアン、アルコール、グリベンクラミド、麦角アルカロイド（エルゴタミン、など）	
ベンゾジアゼピン系薬剤	フェノチアジン誘導体、MAO 阻害薬	
ラモトリギン	リスペリドン（傾眠の頻度増加）	
ペランパネル		経口避妊薬
ルフィナミド		トリアゾラム、経口避妊薬
臭化カリウム	バルビツール酸誘導体（両者相互に作用増強） フェノチアジン誘導体（両者相互に作用増強）	

SSRI：選択的セロトニン再取り込み阻害薬。

ベンゾジアゼピン系薬剤：クロナゼパム、クロバザム、ニトラゼパム、ジアゼパム。