

⑦ EULAR/ACR 分類基準 (2019) 

臨床項目	スコア (各項目の最大スコアを採用する)
1. 発熱	2
2. 皮膚病変 非瘢痕性脱毛	2
口腔内潰瘍	2
亜急性皮膚ループスや円板状ループス	4
急性皮膚ループス	6
3. 関節病変 2 個以上の滑膜炎 or 2 個以上の関節圧痛と 30 分以上の朝のこわばり	6
4. 神経病変 せん妄	2
精神病	3
けいれん	5
5. 浆膜炎 胸水 or 心囊液貯留	5
急性心外膜炎	6
6. 血液学的病変 白血球減少症 (<4,000/ $\mu\text{L}$ )	3
血小板減少症 (<10 万/ $\mu\text{L}$ )	4
自己免疫性溶血	4
7. 腎病変 尿蛋白 >0.5 g/24 hr	4
腎生検でループス腎炎 class II or V	8
腎生検でループス腎炎 class III or IV	10
免疫項目	スコア (各項目の最大スコアを採用する)
1. 抗リン脂質抗体 抗カルジオリピン IgG > 40 GPL unit or 抗 $\beta$ 2GP I IgG > 40 umits or ループスアンチコアグラント陽性	2
2. 補体 低 C3 or 低 C4	3
低 C3 and 低 C4	4
3. 特異的抗体 抗 ds-DNA 抗体	6
抗 Sm 抗体	6

抗核抗体 80 倍以上を必須条件とし、臨床項目・免疫学的項目のスコアを加算し 10 点以上で SLE と診断する。ただし、最低 1 項目の臨床項目を満たすことが必要である。  
(Aringer M, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2019 ; 78 : 1151-9)